

# Tobaksforbruget i Danmark 1920-1975

AF Poul EBBE NIELSEN & NIELS BYGOM KRARUP

I de senere år er fremkommet flere omfattende rapporter, som påpeger den statistisk signifikante sammenhæng mellem det stigende tobaksforbrug og hyppigheden af forskellige sygdomme som lungecancer, iskæmisk hjertesygdom og kronisk bronchitis (1, 6, 8, 14, 15, 17). Som et meget tungtvæjende argument for kausal sammenhæng mellem tobaksforbruget og de nævnte sygdomme peges på, at sygdommene aftager efter ophør med tobaksrygning. Kun enkelte forf. har angrebet dette synspunkt, idet de hævder, at sammenhængen mellem tobaksforbruget og hyppigheden af de nævnte sygdomme ikke med sikkerhed er af kausal natur (4, 7).

I et tidligere arbejde (11) har vi vist, hvorledes dødeligheden af lungecancer i Danmark er stærkt stigende. I 1972 døde 1743 mænd og 411 kvinder af lungecancer (i 1950 kun henholdsvis 383 og 92). Stigningen er langt størst i hovedstadsområdet, især blandt mænd i alderen 55-74 år, mindre i provinserne og mindst i landdistrikterne. På denne baggrund søger vi i dette arbejde at belyse tobaksforbruget i Danmark, specielt de geografiske samt køns- og aldersmæssige forskelle.

## EGNE UNDERSØGELSER

### Metode

Oplysningerne om det totale tobaksforbrug i en række vestlige lande er indhentet dels fra Direktoratet for toldvæsenet (5), dels fra Tobacco Research Council, London (2).

I et forsøg på en mere udførlig analyse af det danske tobaksforbrug er der indhentet og bearbejdet oplysninger fra Gallup markedsanalyse, som gennem en årrække har indsamlet markedsdata for tobaksindustrien. Man udsøger i disse undersøgelser årligt ca. 20.000 danskere om deres tobaksforbrug. Indsamlingen af disse data foregår løbende ca. hveranden uge, hvor ca. 1.000 tilfældigt udvalgte personer over hele Danmark bliver udspurgt om deres tobaksforbrug »i går«. I nærværende analyse, som omfatter 5.550 mænd og 5.666 kvinder

Fra Bispebjerg hospital, København, medicinsk afdeling C og Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, medicinsk afdeling C

udspurgt i første halvdel af 1975, er belyst procenten af rygere og ikke-rygere og den anvendte tobaksform i relation til alder, køn og geografisk område.

Resultatet af denne undersøgelse fra 1975 er sammenlignet med den eneste tidligere publicerede store undersøgelse af danskernes rygevaner, en undersøgelse som blev iværksat af Sundhedsstyrelsen i 1952-54 som led i en større befolkningsundersøgelse (9, 10, 12). Sidstnævnte undersøgelse omfattede tobaksforbruget blandt 11.492 mænd og 11.800 kvinder udspurgt i perioden august 1952 til april 1953. Det skal pointeres, at man i denne undersøgelse spurte de tilfældigt udvalgte personer ved hjælp af spørgsmålet: »Hvor meget ryger De normalt per uge?« Rygerne blev derefter inddelt i 4 grupper (cigaret, pipe, cigaret og cerutrygere), afhængigt af hvilken tobaksform man anså for den vigtigste for den interviewede. Som statistisk test er anvendt  $\chi^2$ -test (signifikansgrænsen  $p < 0,05$ ).

### Resultater

1920-1973

Fig. 1, 2 og 3 viser det årlige forbrug af cigaretter, cerutter, cigaretter, røgtobak, skrå og snus i Danmark i årene 1920-73.

For cigaretterne ses efter en mindre stigning i 1920'erne og et fald under 2. verdenskrig en betydelig stigning i forbruget gennem de sidste 25 år. Det årlige registrerede forbrug i 1973 var 7,1 milliarder cigaretter. Hertil skal lægges den mængde cigaretter, som købes på rejseruterne (fly og skibe), hvilket ifølge toldvæsenets oplysninger skønsmæssigt udgjorde ca. 1,2 milliarder i 1973. Det gennemsnitlige daglige forbrug per indbygger kan således udregnes til at have været i 1953 2,4 cigaretter, i 1963 3,3 cigaretter og i 1973 3,9 cigaretter. Det er bemærkelsesværdigt at iagttagelse den fortsatte stigning i cigaretforbruget igennem 1960'erne ganske upåvirket af prisstigningerne, en erfaring der også er gjort i udlandet.

For cerutterne og cigaretterne ses på samme måde som for cerutterne en stigning op til 2. verdenskrig, et fald under denne og en fornyet, dog betydelig mindre stigning efter krigen. Fra midten af 1960'erne afløses den mindre stigning af et jævnt fald i det årlige forbrug. I 1973 var det årlige forbrug af cigaretter og cerutter henholdsvis 236 millioner og 707 millioner, hvilket fordelt på befolkningen svarer til et dagligt forbrug på 1 cigaret og 1 cerut for

Consumption		Daily		Total in 1973		per inhabitant	
Cigarettes	7108 mill	19.5 mill	3.9	7108 mill	19.5 mill	3.9	
Cigarillos	707 mill	1.9 mill	0.38	707 mill	1.9 mill	0.38	
Cigars	236 mill	0.65 mill	0.13	236 mill	0.65 mill	0.13	
Pipe Tobacco	2023 mill kg	5550 kg	1.1 g	2023 mill kg	5550 kg	1.1 g	
Chewing Tobacco	0.337 mill kg	925 kg	0.19 g	0.337 mill kg	925 kg	0.19 g	
Snuff							

Table 1. Tobacco consumption in Denmark in 1973.

Fig. 7 er der foretaget en nærmere analyse af totalrygerprocenten i relation til geografisk område i Danmark. Hos såvel mænd som kvinder ligger rygerprocenten i hovedstaden signifikant højere end i provinserne, hvor rygerprocenten igen ligger signifikant højere end blandt landbefolkningen. Denne forskel går bortset fra ubetydelige afvigelser igen ved opdeling i aldersgrupper. Blandt kvinderne er der i alle 3 områder et signifikant fald i rygerprocenten fra aldersgruppen 20-

Fig. 7 er der foretaget en nærmere analyse af totalrygerprocenten i relation til geografisk område i Danmark. Hos såvel mænd som kvinder ligger rygerprocenten i hovedstaden signifikant højere end i provinserne, hvor rygerprocenten igen ligger signifikant højere end blandt landbefolkningen. Denne forskel går bortset fra ubetydelige afvigelser igen ved opdeling i aldersgrupper. Blandt kvinderne er der i alle 3 områder et signifikant fald i rygerprocenten fra aldersgruppen 20-


ANALYSE AF TOBAKSFORBRUGET I DANMARK I 1975

Norge kan formentlig forklares ved en udstrakt hjemmerulning. Af Fig. 6 ses, at det totale tobaksforbrug (alle tobaksformer) per voksen indbygger per år gennem de sidste 20 år har været forbløffende konstant i de nævnte lande. Det bemærkes, at det totale tobaksforbrug i Danmark per indbygger ligger ca. dobbelt så højt som forbrugt i de øvrige skandinaviske lande og endog højere end forbrugt i England. Man kan således konkludere, at der i alle landene har været en tendens til, at en større og større del af det samlede tobaksforbrug bliver konsumeret i form af cigaretter.

Forbrugt af pibetobak har været forbavsende konstant gennem de sidste 20 år og udgjorde i 1973 2,0 mill. kg, hvilket svarer til et dagligt forbrug af en pakke pibetobak (50 g) per 45 voksne. Forbrugt af skrå og snus har været ganske jævnt faldende gennem alle årene, omend der dog stadig i Danmark anvendes ca. 1 ton om dagen. Hvad angår relationen til forbrugt i andre vestlige lande, fremgår dette af Fig. 4, 5 og 6, dels for cigaretter og dels for det totale årlige tobaksforbrug.

Forbrugt af pibetobak har været forbavsende konstant gennem de sidste 20 år og udgjorde i 1973 2,0 mill. kg, hvilket svarer til et dagligt forbrug af en pakke pibetobak (50 g) per 45 voksne. Forbrugt af skrå og snus har været ganske jævnt faldende gennem alle årene, omend der dog stadig i Danmark anvendes ca. 1 ton om dagen. Hvad angår relationen til forbrugt i andre vestlige lande, fremgår dette af Fig. 4, 5 og 6, dels for cigaretter og dels for det totale årlige tobaksforbrug.

Fig. 1-3. Annual consumption of cigarettes, cigarillos, cigars, smoking tobacco, chewing tobacco, and snuff in all Denmark 1920-1973.



Resultatet af nærværende befolkningsundersøgelse i 1975 er sammenlignet med tidligere indsamlede data fra befolkningsundersøgelsen i 1952-54 (Tabel IV), Tabellen FORBRUGET I 1953

TOBAKSFORBRUGET I 1975 SAMMENLIGNET MED

mindst 15 cigaretter. 311.000 mænd og ca. 238.000 kvinder, som dagligt ryger cigaretforbrug i Danmark finder sted blandt de ca. tabellen fremgår yderligere, at halvdelen af det totale oplyst af toldvæsenet for første halvdel af 1975. Af mellem det beregnede forbrug og det totale forbrug personer (Tabel III) finder man god overensstemmelse cigaretforbrug i Danmark ud fra de udspurte ca. 11.000 Foretager man en beregning af det samlede

1/5. mænd ca. 1/4 mindst 15 cigaretter dagligt, blandt kvinder hovedstadsområdet ryger blandt de 20-29 årige findes der således mange stortrygere. cigaretforbrug på mindst 15. Selv blandt de helt unge unge mænd og 5,2% af de unge piger havde et dagligt ca. 900 udspurte i alderen 15-19 år fandtes, at 3,6% af de geografiske forskelle er statistisk signifikante. Blandt de nævnte forskelle mellem mænd og kvinder samt de henholdsvis 7,6 og 4,7% for provinsbyerne 12,5 og 7,5. De tilsvarende procentsatser for landbefolkningen var kun 14,3% af kvinderne mindst 15 cigaretter dagligt. De 8,8% i hovedstadsområdet røg 19,3% af mændene og af stortrygere i gennemsnit for mænd 12,7% og for kvinder geografiske fordeling. For hele Danmark var procenten (mindst 15 cigaretter dagligt). Man genfinder den geografiske fordeling af stortrygere af cigaretter

Fig. 9 viser fordelingen af stortrygere af cigaretter begge grupper den samme geografiske fordeling. cigaretter. Man genfinder ved denne opgørelse i I Fig. 8 har vi en tilsvarende opgørelse, men nu for stærkt omkring de 60. rygerprocenten aftagende fra 40-50 års alderen og falder 24 til aldersgruppen 25-29 og derefter en langsom stigning til 40 års alderen. For begge køn er

Table II. Distribution of smokers in Denmark 1975.


sex	age years	sample no	smokers				total %	pipe %	cigars %	only cigars %
			total	cigarettes	cigarettes	only				
Males	15-19	495	41,4	37,8	21,8	2,0	0,6	-	-	
	20-24	398	61,6	57,0	36,7	4,0	-	-	-	
	25-29	545	62,4	54,1	33,8	5,3	-	-	0,7	
	30-39	939	63,9	47,6	28,2	8,2	0,9	-	3,5	
	40-49	930	70,3	50,0	29,8	8,5	0,2	-	6,8	
	50-64	1322	66,4	37,7	21,3	7,9	1,1	-	10,6	
65+	921	51,5	14,5	9,1	7,9	2,6	-	14,4		
Total		5550	61,2	40,6	24,2	7,0	0,9	-	6,7	
Females	15-19	364	39,6	38,7	36,0	0,3	-	-	0,3	
	20-24	391	57,8	56,0	53,2	1,0	-	-	0,5	
	25-29	644	48,4	46,9	44,3	0,3	0,2	-	0,5	
	30-39	1058	48,7	44,5	43,0	0,5	-	-	3,5	
	40-49	926	54,6	48,2	46,5	0,2	-	-	5,6	
	50-64	1271	43,7	30,6	28,7	0,2	0,2	-	11,6	
65+	1021	29,1	12,5	10,8	0,3	0,2	-	15,2		
Total		5666	45,0	37,0	35,0	0,3	0,1	-	7,0	

Table III. Total consumption of cigarettes in Denmark 1975.

Daily consumption of cigarettes	Men		Women	
	Estimated no. of subjects	Daily consumption of cigarettes	Estimated no. of subjects	Daily consumption of cigarettes
1-7 cigarettes	281.000	1.124.000	313.000	1.355.000
8-14 "	371.000	4.080.000	400.000	4.400.000
15-19 "	260.000	4.560.000	205.000	3.600.000
≥ 20 "	51.000	1.280.000	33.000	825.000
Total per day	11.044.000		10.180.000	
Estimated consumption in 1975: 7.75 milliards				

omfatter totalrygerprocenten, procenten af cigaretter og af stor-cigaretrøgere blandt mænd og kvinder i såvel hovedstadsområdet som provinsbyer og landområder. Der ses for samtlige områder et signifikant fald i totalrygerprocenten blandt mænd fra gennemsnitlig 7,8% i 1953 til 6,2% i 1975. I samme tidsrum har der været en stigning i rygerprocenten for kvinder fra 39,9 til 45,0 (P < 0,05). Stigningen i rygerprocenten blandt kvinder er mest udtalt i landbefolkningen, hvorimod der ikke har været signifikant stigning i rygerprocenten i hovedstaden og provinsbyerne. I den nævnte periode er der blandt mænd sket en afgørende ændring i rygevanerne, idet procenten af cigaretter er steget ganske betydeligt (fra 23,4 i 1953 til 40,6 i 1975). Denne stigning genfindes i alle geografiske områder (Tabel IV), og mest udtalt er stigningen blandt landbefolkningen (fra 13,0% til 35,7%), i samme periode er procenten af piberøgere i Danmark faldet betydeligt (fra 38,2 i 1953 til 7,0 i 1975). Blandt kvinderne er det både i 1953 og 1975 cigaretterne, som er den langt dominerende tobaksform. Antallet af stor-cigaretrøgere (≥ 15 cigaretter dagligt) er i den nævnte 20 års periode

Fig. 4-5. Annual consumption of cigarettes among the adult population in different countries 1920-1971.



Det mest påfaldende resultat af dette forsøg på at belyse tobaksforbrug i Danmark er konstatering af det stærkt stigende cigaretforbrug, i 1973 ifølge oplysninger fra tolvåsenet over 20 millioner daglig. I stærk modsætning til denne stigning i cigaretforbrug ses det, at totalforbrug af røgtobak har været stationært, mens forbrug af cerutter og cigaretter har været jævnt faldende siden midten af 1960'erne. Forbrug af cigaretter hænger såvel blandt mænd som blandt kvinder nøje sammen med urbaniseringsgraden. Forbrug var person næsten dobbelt så stort i hovedstadsområdet som i landdistrikterne. Ved sammenligningen mellem dataerne fra 1953 og 1975 kunne man iagttage en kraftig stigning i procenten af cigarettygere blandt mænd, hvorimod der kun har været en beskedent stigning i procenten af cigarettygere blandt kvinder. Det skal mindst (5) har været kraftigt stigende såvel blandt denne undersøgelse defineret ved et dagligt forbrug på imidlertid fremhæves, at antallet af stor-cigarettygere (i procenten af cigarettygere blandt kvinder. Det skal som anført i metodeafsnittet blev befolkningen i 1953 udspurgt om deres gennemsnitlige ugentlige forbrug, hvorimod man i undersøgelsen fra 1975 har udspurgt befolkningen om deres forbrug i år. Det er derfor muligt, at procenten af rygere i 1975 vil ligge lidt højere end de anførte procentværdier i denne artikel. Dette har dog næppe nogen indflydelse på de kønsmæssige forskelle, som er påvist. Det skal endvidere nævnes, at man i 1953-undersøgelsen rubricerede rygerne, således at de enten hørte til blandt cigaret-, cerut-, pipe- eller cigarrygere, afhængigt af deres største forbrug, hvorimod en sådan opdeling ikke er mulig i 1975-undersøgelsen. Dette

DISCUSSION

forbulet blandt mændene og næsten tidoblet blandt kvinder. Analyser man ændringerne i tobaksvanerne fra 1973 til 1975 i relation til alderen, finder man for mændenes vedkommende et klart fald i rygerprocenten i samtlige aldersgrupper, men samtidig en stigning i procenten af cigarettygere i de samme aldersgrupper. Blandt kvinderne gennemfindes stigningen i såvel totalrygerprocenten som procenten af cigarettygere i aldersgrupperne over 40 år. I den yngste aldersgruppe (15-19 år) er observeret en stigning i rygerprocenten i hovedstaden, uforandret rygerprocent i provinsbyerne og et mindre fald i landdistrikterne.

forhold vil således tendere til at afsvække den klare forskel i procenten af cigarettygere, når man sammenligner 1953 med 1975, men vil dog på ingen måde kunne forklare ændringerne helt. Vi har derfor ment det mest rimeligt i undersøgelsen at anføre såvel procenten af cigarettygere, som procenten blandt befolkningen, der kun ryger cigaretter. Fra tidligere markedsanalyser ved man, at den gennemsnitlige procent af røgtobak har været langsomt stigende gennem de sidste 10 år: 1963: 35 %, 1966: 36 %, 1967: 37 %, 1972-73: 39 %. Med hensyn til rygevanerne i relation til alderen for undersøgelsen skal det pointeres, at procenten af rygere i den yngste aldersgruppe (15-19 årige) i såvel undersøgelse-

Table IV. Tobacco consumption in Denmark 1975 compared to 1953.

	Denmark		Capital		Provincial		Rural Area	
	1953	1975	1953	1975	1953	1975	1953	1975
% smokers	M 77.8	61.2	81.5	66.8	79.1	62.5	74.2	55.3
	F 39.9	45.0	50.1	51.7	43.3	44.9	27.6	38.4
% cigaret-smokers	M 23.4	40.6	36.4	45.7	25.3	41.4	13.0	35.7
	F 32.9	37.0	40.3	42.6	35.4	36.1	24.0	32.3
% with daily consumption ≥ 15 cigarettes	M 6.8	12.7	19.3	7.2	12.5	2.4	7.6	4.7
	F 1.0	8.8	14.3	14.3	7.5	2.4	4.7	4.7

Fig. 8. Frequency of cigarette-smokers related to urbanization, Denmark 1975. C = Capital, P = Provincial towns, R = Rural area. Males (M) and females (F).




Fig. 7. Frequency of smokers related to urbanization, Denmark 1975. C = Capital, P = Provincial towns, R = Rural area. Males (M) and females (F).





Fig. 6. Total annual consumption of tobacco per adult in different countries 1950-1970.



Der fremlægges en undersøgelse og analyse af tobaksforbruget i Danmark. Gennem de sidste 30 år er forbruget af cigaretter steget betydeligt, medens forbruget af cerutter og cigarer er faldende og forbruget af røgtobak er ret konstant. Det gennemsnitlige daglige cigarettorbrug per indbygger i Danmark var i 1953 2,4, i

RESUME

I de senere år er fremkommet en række arbejder, der på meget overbevisende måde fremhæver korrelationen mellem stigende tobaksforbrug, især cigarettorbrug, og incidensen af iskæmisk hjertesygdom. Særligt overbevisende virker den faldende risiko efter ophør med cigarettorbrug, således at eks-rygere efter ca. 10 års ophør med cigarettorbrug kommer ned på incidens af iskæmisk hjertesygdom, som svarer til ikke-rygeres. Fortsatte undersøgelser relateret til de nyeste tal om tobaksforbrug vil være af interesse.

For nylig har man rapporteret fra England om et mindre fald i dødeligheden af lungecancer blandt mænd forbrugt af cigaretter, idet der gennem de senere år har været et tiltagende forbrug af filtercigaretter, som har et lavere tjæreindhold end almindelige cigaretter. Et lignende fald blandt mænd er iagttaget i USA. Forbruget af cigaretter i Danmark har ændret sig på samme måde som i England, men der er endnu ikke indtrådt et fald i dødeligheden af lungecancer herhjemme.

Som nævnt peger epidemiologiske undersøgelser gennem de sidste mere end 20 år særligt på, at kraftig cigarettorbrug er en vigtig ætiologisk faktor for udvikling af lungecancer (3, 6, 13). Som også nævnt har vi et tidligere arbejde (11) belyst stigningen i mortaliteten af lungecancer gennem de sidste godt 20 år og de køns- og aldersmæssige samt geografiske forskelle, der præger denne stigning. De her fremlagte nye tal for tobaksforbrug, specielt cigarettorbrug, viser en påfaldende overensstemmelse med de tidligere fremlagte tal for fordelingen af og ændringerne i mortalitets-talene for lungecancer. Særligt dødeligheden af lungecancer sættes i relation til cigarettorbruget i en række vestlige lande, finder man en svag statistisk signifikant sammenhæng mellem de to faktorer. Dødsårsagssatistik er dog generelt behæftet med en vis usikkerhed.

sen fra 1953 som undersøgelsen fra 1975 kun adskiller sig ringe fra den gennemsnitlige rygeprocent i den voksne befolkning. Rygevanerne synes således konsolideret allerede i 20-25 års alderen.

Fig. 9. Frequency of heavy cigarette-smokers in Denmark 1975. C = Capital, P = Provincial towns, R = Rural area. Males (M) and females (F).

